23. 8bre. 1755.

n.° 27.

Un Dragon nommé Le Loup du Regim.t de Mattha, agé de 22 Ans, tomboit au Mois d'Aout 1743 de son cheval, et se cassoit l'humerus droit à 2 à 3 travers de doigts au dessus du Coude, la fracture étoit oblique et en bec de flûte. Son Chirurgien Major le pansoit pendant quelque tems, mais l'Escadron, dans le quel se trouve le Dragon ayant été detaché à une autre Garnison, un autre chirurgien au quel il s'addressoit, pretendoit, je ne sais par quelle raison, que la reduction n'étoit pas bien faite; persuadoit le Malade de subir des Extensions, qu'il lui fit pendant deux heures avec beaucoup de Violence, au bout des quelles il lui assura, que son bras avoit été heureusement recassé et remis comme il le falloit. On appliqua sur la fracture un Appareil, qui n'étoit guere de plus d'etendue, que de 3 à 4 travers de doigts, sans gener le Coude, et avec deux attelles placées sur les deux cotés de la longueur d'un pouce. Le Malade qui est d'une vivacité extreme jouoit et se servoit de son bras pendant 5 Mois, au bout des quels les Os ne se trouvoit reunis que par le moyen d'une Membrane, qui laissoit un jeu libre aux deux bouts des os, en sorte qu'en flechissant l'avant bras l'endroit de la fracture se plioit et formoit l'Espece d'un second Coude.
Il resta dans cet Etat jusqu'au 13 Juillet 1744., qu'il tomba de nouveau du cheval, et se cassa cette coherence, ce qui l'obligea de venir à l'hopital militaire de cette Garnison. comme je m'apperçus que les bouts des Os se frottoient trop uniment sans la moindre crepitation, j'interrogois le Malade sur son etat anterieur, sans avoir pu en tirer autre chose, si non que son bras avoit été cassé au meme endroit, et bien guéri.

ARC 33 d. 32^{e}7
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

je pansois mon homme methodiquement, et crainte que son humeur inquiet et polisson ne derangeat la fracture, j'appliquois unne longue bande par dessus l'appareil pour attacher le bras et l'avant, bras contre le corps, sans qu'il put le remuer en aucune façon. Au bout de deux Mois voyant, que malgré qu'il n'y avoit eu aucun accident facheux, que les bouts de la fracture ne se reprendroint point solidement, je m'informois auprès de ses officiers, qui les premiers et ensuite le Dragon meme m'ap, prirent le detail que j'ai marqué plus haut. par la je compris que le petit Bandage leger n'avoit point empeché la petulanté vivacite du Malade de mouvoir le bras, et que le frottement frequent des Os avoit produit unne Cicatrice à chaque extremité des bouts cassés. sur cette Idée je formois le plan d'unne Guerison radicale; qui etoit de renouveller la fracture, pour la traiter en fracture compliquée. pour cet effet je placois le bras & Avant bras depuis l'epaule jusqu'a la main dans unne boette de bois, je fis unne incision de 6 à 7 travers de Doigts de longueur jusqu'au Periosste, je liois unne Artere musculaire qui donnoit, je detachois le Muscle brachial externe en me, nageant ses fibres tant qu'il etoit possible, je separois l'ad, herance du long supinateur, & du long extenseur, ce qui m'obligoit de couper le ligament intermusculaire, et je fis ecarter les levres de la playe, qui me fit voir, que le Periosste s'etoit epaissi autour de la fracture au point, qu'il ressembloit au fascia lata d'un homme fort. & qu'il formoit unne espece de Capsule ligamenteuse propre à ceder à l'action des Muscles Moteurs de l'avant bras. Ayant ouvert cette Capsule, je pouvois à l'aide d'unne flexion vers le coté interne pousser mon Doigt

entre l'adherance des deux os, qui cedoit à un effort mediocre, que j'ai fait pour la detacher : alors je placois unne lame de plomb entre l'extenseur long, la partie du brachial interne & l'os, et avec des ciseaux et gouges j'emportois tout le callus qui se trouvoit aux bouts de l'os, jusqu'a ce que mon doigt n'y trouvoit plus de surface lisse et polie ; je coupois aussi la capsule epaissie le plus qu'il m'etoit possible, ne pouvant point l'emporter entierement du coté interne, ou mon doigt sentoit manifestement le battement de l'artere brachiale.
je pansois ensuite le bras comme d'unne fracture compliquée avec un bandage à 12 chefs et le plus rarement, que la matiere me le permettoit. l'exfoliation des pieces detachées ne se fit qu'au bout de 4 semaines, à la suite de la quelle, je genois le bandage d'avantage par le moyen des attelles, et insensiblement dans l'espace de 10 semaines la playe s'est guerie à un petit ulcere superficiel ~~pr~~ qui en reste encore les deux bouts des os etant deja fortement collés, au point que malgré ma defense le malade s'est avisé de lever son bras et de flechir l'avant bras pendant que je le pansois et qu'il etoit sans bandage. Je compte cependant de lui en faire porter un dans unne boette de fer blanc, pour gener l'action de l'avant bras pendant deux mois, parce que le callus ne deborde presque point les os, et que je crains que le malade par quelque effort imprudent ne me fasse perdre le fruit de mes peines et de ses douleurs.

par Mr Offmann chirurgien
Major de l'hopital de
Maestrick

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE